

# PerPiel

Vitamina A

Vitamina E

Alantoína

Crema / Emulsión

USO EXTERNO

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

## Composición:

### PERPIEL Crema

Cada 100 g de crema contiene:

Vitamina A (como Palmitato) . . . . .	600.000 UI
Alantoína . . . . .	.250 mg
Vitamina E (como Acetato) . . . . .	.50 mg
Alcohol cetearílico / Ceteareth 20 . . . . .	.9 g
Estearato de glicerilo / Ceteareth 20 . . . . .	4,5 g
Estearato de propilenglicol . . . . .	.4 g
Propilenglicol . . . . .	3,5 g
Glicerina . . . . .	.3 g
Sorbitol 70 % . . . . .	2,5 g
Vaselina líquida . . . . .	.2,5 g
Estearato de tridecilo y Dicaprilato de neopentilglicol / Dicaprato y tridecil trimellitato . . . . .	2 g
C 12-15 Alquil benzoato . . . . .	2 g
Polisorbato 60 . . . . .	1,5 g
Miristato de Miristilo . . . . .	1 g
Dimeticona . . . . .	0,9 g
Metilparabeno . . . . .	.120 mg
Cloruro de benzalconio . . . . .	100 mg
Propilparabeno . . . . .	50 mg
EDTA disódico . . . . .	.50 mg
Citrato de sodio dihidrato . . . . .	.50 mg
Acido cítrico . . . . .	.50 mg
Hidróxido de sodio . . . . .	.22 mg
Butilhidroxitolueno . . . . .	.20 mg
Butilhidroxianisol . . . . .	.10 mg
Esencia . . . . .	.0,15 ml
Agua purificada c.s.p. . . . .	.100 g

## Composición:

### PERPIEL Emulsión

Cada 100 g de emulsión contiene:

Vitamina A (como Palmitato) . . . . .	.500.000 UI
Alantoína . . . . .	.250 mg
Vitamina E (como Acetato) . . . . .	.50 mg
Propilenglicol . . . . .	3,5 g
Alcohol cetearílico / Ceteareth 20 . . . . .	.3,1 g
Glicerina . . . . .	.3 g
Sorbitol 70 % . . . . .	.2,5 g
Vaselina líquida . . . . .	.2,5 g
Estearato de glicerilo / Ceteareth 20 . . . . .	2 g
Estearato de tridecilo y Dicaprilato de neopentilglicol / Dicaprato y tridecil trimellitato . . . . .	2 g
C 12-15 Alquil benzoato . . . . .	.2 g
Polisorbato 60 . . . . .	1,4 g
Miristato de Miristilo . . . . .	1 g
Dimeticona . . . . .	0,8 g
Carbomero . . . . .	260 mg
Metilparabeno . . . . .	.120 mg
Cloruro de benzalconio . . . . .	100 mg
Hidróxido de sodio . . . . .	.72 mg
Propilparabeno . . . . .	.50 mg
EDTA disódico . . . . .	.50 mg
Citrato de sodio dihidrato . . . . .	.50 mg
Butilhidroxitolueno . . . . .	.20 mg
Butilhidroxianisol . . . . .	.10 mg
Esencia . . . . .	.0,15 ml
Agua purificada c.s.p. . . . .	.100 g

## Acción Terapéutica:

Protectora y regeneradora de los tejidos epiteliales. Código ATC: D02AX

## Indicaciones:

- Prevención de estrías principalmente en los muslos, glúteos, caderas y senos.
- Ayuda a prevenir durante el embarazo y post parto, la aparición de estrías atróficas y grietas del pezón.
- Cuidado de la piel seca y prevención de arrugas.

## Acción farmacológica:

La vitamina A promueve la proliferación y diferenciación celular de los tejidos, fortalece el sistema inmune, regula el proceso de la inflamación y la producción de sebo. Colabora en la formación y mantenimiento de las membranas mucosas y de la piel. La vitamina E es

S771/140





un agente antioxidante que protege a los tejidos de la acción nociva de los radicales libres. La alantoina estimula la proliferación y reconstrucción de los tejidos, tiene acción queratolítica.

**Farmacocinética:**

**PERPIEL**, luego de su aplicación tópica sobre piel intacta, se absorbe mínimamente a nivel sistémico. Dicha absorción aumenta en caso de heridas, úlceras, procesos inflamatorios y con el uso de vendajes oclusivos (se debe evitar).

**Posología – Modo de uso:**

Aplicar **PERPIEL**, una o dos veces por día en la zona a tratar, con un suave masaje circular, para favorecer su penetración **PERPIEL** es hipoalergénica.

**Contraindicaciones:**

- Hipersensibilidad a los principios activos o cualquier componente de la fórmula.
- Eczema.
- Uso concomitante de otros medicamentos que contengan Vitamina A, por riesgo de intoxicación o sobredosis.

**Advertencias y Precauciones:**

Higienizar la piel antes de aplicar **PERPIEL**. Se desaconseja su aplicación en los senos antes de amamantar, para evitar el riesgo de ingestión por el bebé.

En casos de irritación severa de la piel, **PERPIEL** se aplicará cuando la zona este menos sensible.

**Empleo en Pediatría:** el riesgo de efecto sistémico de la vitamina A aplicada tópicamente en la piel, es mayor en el lactante y en el niño de primera infancia.

**Reacciones adversas:**

Eczema de contacto luego del uso prolongado o con el empleo de vendajes oclusivos. El riesgo de hipervitaminosis A se considerará cuando la aplicación tópica se realice por períodos prolongados, en zonas extensas, bajo oclusión o sobre piel lastimada o quemada, sobre mucosas, o sobre la piel de bebés prematuros.

**Sobredosificación:** No se han reportado casos de sobredosis.

**“Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano ó comunicarse con los Centros de Toxicología:  
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777”**

**“Mantener fuera del alcance de los niños”  
Conservar a temperatura hasta 30° C y al abrigo de la luz.**

**Presentación:**

**PERPIEL Crema:** Envases con 50 y 200 g.

**PERPIEL Emulsión:** Envases con 100, 200 y 400 g.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Director Técnico: Vicente López González, Farmacéutico.

Certificado N° 55.771

Fecha de última revisión: 02/09/2010



**Laboratorios Bernabó**

LABORATORIOS BERNABO S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, C.A.B.A., Tel.: 4501-3278/79, [www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)

Elaboración y envasado:

Cnel. Méndez 440 B1875DQJ Wilde, Pcia. de Buenos Aires.

