

PLAC-OUT

DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA

GEL ANTISÉPTICO PARA USO TÓPICO BUCAL

Composición:

Cada 100 g contiene:

Digluconato de clorhexidina (solución al 20%) 0,6 g; Excipientes: xilitol, glicerina, hidroxipropilmetilcelulosa, propilenglicol, extracto glicólico de Aloe vera, PEG 40 aceite de castor hidrogenado, mentol, acesulfame potásico, metilparabeno, propilparabeno, agua purificada, c.s.

Descripción: Antiséptico bucal. Bactericida de acción local frente a organismos gram-positivos y gram-negativos. También posee efecto microbicida frente a hongos, esporas y virus.

Indicaciones y Modo de uso: **PLAC-OUT Gel** se puede utilizar para prevención de infecciones por gérmenes de la cavidad bucal y de formación de placas bacterianas. Prevención de caries dental.

Coadyuvante en gingivitis, estomatitis, aftas, mucositis, candidiasis, gingivitis necrotizante aguda, periodontitis, gingivitis localizada.

Antisepsia de impresiones dentales, cirugía o procedimientos odontológicos.

Mejorar halitosis de origen bucal.

PLAC-OUT Gel puede ser usado para el cepillado dental, como topicación o masaje gingival o para la higiene de los espacios interdentes. Para el cepillado colocar 2 cm de gel y cepillar suavemente 2 veces por día o según indicación del odontólogo.

Para la higiene de los espacios interdentes impregnar hilo dental y los cepillos interdentes con **PLAC OUT Gel**.

Para masajes colocar 2 cm de gel sobre la yema de los dedos y realizar un masaje suave sobre las encías.

Para topicación utilizar cubetas individuales o una torunda de algodón con 2 cm de gel durante 3 minutos sobre la zona afectada.

No enjuagar la boca luego de la aplicación de **PLAC OUT Gel**.

Si los síntomas persisten o empeoran a las 48 hs consulte a su odontólogo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a clorhexidina. Niños menores de 3 años.

Advertencias y precauciones: La duración de su uso no debe superar el tiempo indicado por su odontólogo.

Al comienzo del tratamiento pueden presentarse alteraciones del gusto, que generalmente disminuyen con el uso continuo del producto.

Durante la administración prolongada puede provocar pigmentación dental y aumento del cálculo dental.

En caso de persistencia de los síntomas luego de 5 días de tratamiento o de aparición de fiebre

consultar al odontólogo.

No ingerir.

Tomar te o café inmediatamente luego de usar **PLAC-OUT** puede provocar pigmentación dental más intensa.

Evitar el uso concomitante con otros antisépticos.

Reacciones adversas: Con el uso prolongado de **PLAC OUT Gel** y el contacto con ciertas bebidas y alimentos tales como vino tinto, café, tabaco pueden mancharse levemente los dientes y la superficie de la lengua.

Puede presentarse irritación bucal o de la lengua o alteración de la percepción del sabor.

Sobredosificación:

“Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962 - 2247 / 6666

Hospital A. Posadas (011) 4658 - 6648 / 4658 - 7777”

“Mantener fuera del alcance de los niños”

Ante cualquier duda consulte a su Odontólogo y/o Farmacéutico.

VISITE PERIODICAMENTE A SU ODONTOLOGO

Seguridad del envase: Verificar que la lámina metálica de la boca del pomo se encuentra intacta

Conservación: Conservar a una temperatura entre 15° y 30°C.

Presentación: Pomos con 60 g de gel.

Comercializado por:

LABORATORIOS BERNABO S.A., Terrada 2346/48, (C1416ARZ), CABA., Tel.: 4501-3278.

www.laboratoriosbernabo.com

Elaborado por:

BROBEL S.R.L., Cnel. Méndez 440, (B1875 DQJ) Wilde, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: Esteban Alberto Ferrini, Farmacéutico.

Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico Inscripción ANMAT N° 0033.

Fecha de última revisión: 06/09/2013



Laboratorios Bernabó